



La Señalada

Dr. Adolfo Casaretto

La señalada de corderos constituye un trabajo que se realiza anualmente en los establecimientos de cría de ovinos y comprende tres operaciones simultáneas: la señalada propiamente dicha (muescas en las orejas que indican la propiedad), la castración de machos y el corte de la cola.

¿Cuándo realizarla?

En las pariciones de primavera se destaca, -entre otras ventajas- la concentración de la parición en tan solo 35-40 días. Este aspecto permite que entre los 40 y 45 días de iniciada la parición la mayor parte de los corderos están suficientemente desarrollados para seguir a sus madres hasta los bretes y realizar la señalada sin riegos colectivos de miasis. No tiene mayor sentido demorar la señalada por algunas ovejas que aún no hayan parido, ya que esto podrá hacerse en otra oportunidad.

¿Cómo realizarla?

Es deseable que la majada permanezca el menor tiempo posible en los bretes, juntándola de mañana temprano de manera de terminar el trabajo en el día y con algunas horas de luz. Las condiciones climáticas ideales para hacerla, no siempre posibles, son días de sol y poco viento.

Majadas muy numerosas, se llevarán a los bretes en dos o tres puntas cortadas en el campo de manera de no apartar los corderos de sus madres.

En el acceso a los corrales, es necesario evitar la disparada de corderos.

Ya en el brete donde se va a realizar el trabajo, se van apartando las ovejas, y cuando se disponga de un número suficiente de corderos en un corral seguro, se comenzarán las operaciones. Estas se realizan sobre una mesa o una repisa armada sobre una de las barandas de los bretes, en la que los agarradores irán presentando los corderos sentados, y firmemente sujetos.

También existen bandejas especiales para sujetar a los corderos lo que facilita el trabajo cuando hay poca mano de obra.



Figura 1

Señalada

Aunque es la más importante de las tres operaciones porque establece la propiedad de los animales, es también la más sencilla, y se realiza por medio de cuchillo o pinzas especiales, de acuerdo a la señal (código de muescas) asignada por DICOSE a cada productor. Las pinzas deben presentarse con el filo para el lado de la oreja que tiene lana.

Castración

Con un cuchillo bien afilado se incide la parte distal del escroto permitiendo de esta manera, la extracción de los testículos. La herida resultante sangra poco y muy raramente es susceptible de bicheras. Otro método posible, es dejar colocado un anillo de goma en el cuello del escroto por encima de los testículos, mediante una pinza especial para tal fin. La ligadura realizada produce -en días- la necrosis de la zona y posterior caída de los testículos.. (Figura 1)

Corte de la cola

El corte de la cola tiene por objeto facilitar la identificación de los sexos e impedir la contaminación de la lana de la región, con estiércol y orina. Aunque esta operación se hace comúnmente a cuchillo, pueden



Fig. 2: Formón o pinza candente (Extraído de H.T. Carroll, "Enfermedades de los ovinos", 1957)



Fig. 3.1: Cola cortada largo correcto. La zona de contacto vulva-cola está libre de lana para evitar acumulación de materia orgánica.




Fig. 3.2: Posición del cuchillo para realizar el corte. El lomo del mismo a la altura de la vulva.

usarse pequeñas palas de hierro calentadas a fuego que cortan y cauterizan la herida.

De utilizarse las palas calentadas, es conveniente emplear una tablilla en las hembras para evitar quemarles la vulva. También los anillos de goma pueden ser usados con la finalidad de cortar colas.

El largo de la cola de las hembras deberá permitir tapar la vulva, para evitar posibles bicheras en esa zona cuando adultas.

Es importante que la piel de la cola no esté tirante antes de hacer el corte, de manera que posteriormente la misma, recubra el muñón para facilitar el cicatrizado.

En señaladas tardías (segunda quincena de Octubre) y al solo efecto de prevenir las bicheras, es preferible postergar el corte de la cola de las hembras para el otoño siguiente.

Sanidad en la Señalada

En esta instancia es importante tener presente :

a) **Corderos:** vacunar contra Ectima Contagioso o "Boquera" en todo establecimiento donde hubiere historia de vacunación , donde ha sucedido la enfermedad o en predios que ingresan habitualmente ovinos . En establecimiento "cerrados" sin antecedentes de vacunación y/o enfermedad, consultar con el veterinario de confianza. Esta vacuna se deberá preparar con antelación a su aplicación diluyendo las costras (polvo) en el diluyente (suero). Se administra desengrasando previamente la piel de la verija del cordero (sin la utilización de hidrocarburos), colocando una gota de la vacuna e irritando la piel posteriormente (sin sangrar) con el escarificador (trincheta) que se adjunta a la vacuna. La comprobación de la eficacia de la vacuna se verifica con la aparición a la semana de una costra en el lugar de inoculación.

En señaladas con corderos de 45 días no se recomienda la dosificación antihelmíntica ni vacunación contra Clostridiosis de los corderos. La aplicación en la señalada de esta última vacuna solo se considerará en sistemas intensivos de

producción con un alto nivel de alimentación. Por último, muchos párpados de los corderos se encontrarán evertidos , produciendo conjuntivitis temporales. Es esta una buena oportunidad para poner los párpados en posición y mantenerlos con un breve masaje.

b) **Ovejas:** se administrará un antihelmíntico a efectos de combatir la violenta infestación parasitaria que sucede en toda oveja con cordero al pie entre las 5 y 8 semanas posparto ("alza de lactación"), la cual repercute no solo en el estado de la majada de cría sino también en la futura infestación parasitaria del potrero de lactancia.

Recomendaciones finales

- ✓ Efectuar las operaciones en este orden: señalada, castración, vacunación contra Ectima y corte de la cola
- ✓ Mantener los bretes de trabajo barridos y disponer de un recipiente con una solución antiséptica para desinfectar regularmente los instrumentos de trabajo.
- ✓ Si en el establecimiento existen antecedentes de tétanos o las majadas se encuentran en potreros alejados de las instalaciones centrales, armar bretes portátiles en cada potrero .
- ✓ A medida que se vaya señalando en los bretes: soltar ovejas y corderos a una plazoleta o piquete contiguo con pasto, evitando que los corderos se echen en los corrales para evitar infecciones.
- ✓ Volver las majadas a los mismos potreros de origen, rodeándolas durante una hora para favorecer el encuentro de madres e hijos, ya que el olor a sangre fresca dificulta el encuentro.
- ✓ En señaladas tardías una vez finalizada la castración y el corte de la cola, es conveniente aplicar un producto repelente de la mosca para evitar bicheras.
- ✓ En estas circunstancias, a la semana de efectuada la misma, juntar y hacer desfilar la majada en una esquina del potrero para tratar eventuales bicheras.