



El Destete

Dr. Adolfo Casaretto

El destete es la práctica de manejo que separa a la oveja de su/s cordero/s con la principal finalidad de atender los diferentes requerimientos nutricionales y sanitarios de ambas categorías.

El destete y la edad de los corderos

A partir de las ocho semanas, el desarrollo de los pre-estómagos del cordero producto del estímulo progresivo y creciente del consumo de fibra, le permitiría ser destetado en pasturas de muy alta calidad y con kilajes no menores a 12 kilos (destete temprano). Si la alimentación a destinar fuese campo natural de buena calidad, se sugiere que el destete fuese realizado a los tres meses de edad con un mínimo de 15 kilos de peso vivo, a fin de asegurar un correcto desempeño productivo.

En ningún caso se recomienda el mantenimiento de los corderos al pie de sus madres más allá de tres a tres meses y medio, ya que a las 14 semanas de vida la leche materna solo contribuye con menos del 10 % del total de la energía en la alimentación requerida por el cordero.

ovejas y corderos. Un oveja destetada no tiene requerimientos especiales, por el contrario, los corderos en pleno crecimiento, requieren de pasturas de alta digestibilidad (70 % o mayores).

2. Eficiencia de conversión de pasto a carne de cordero. A partir de aproximadamente la octava semana de lactancia, la conversión de pasto en carne comienza a ser mayor que la eficiencia del doble pasaje: pasto-leche de oveja –carne de cordero.

A las 12 semanas este aspecto es determinante.

3. Infestación parasitaria. Es conocido el fenómeno por el cual entre la quinta y octava semana post-parición las madres que tienen cordero al pie, reducen su natural resistencia a los parásitos gastrointestinales, se cargan de lombrices (“Alza de lactación”) y contaminan con huevos a las pasturas que finalmente infestan a los corderos. Estos, que aun tienen un sistema inmunitario muy inmaduro, comenzarán a sentir los efectos parasitarios a partir de las 12-15 semanas de edad.

● El peso al destete es determinante para la performance productiva futura de los corderos. Investigaciones llevadas a cabo en CIEDAG (H. Norbis 2004), demuestran que independientemente de la estrategia de alimentación post-destete, el peso logrado al final de la recría dependió del peso al destete; siendo los animales más pesados al destete, los más eficientes en todo el proceso productivo.

Para las razas más comunes de nuestro país, criadas a campo natural y con destete de aproximadamente 12 a 14 semanas, debería ser un objetivo destetar corderos con pesos superiores a los 20 kilos.

Fecha de destete : factores a tener en cuenta

Para definir el momento del destete sería importante tener presente los siguientes aspectos:

1. Necesidades nutricionales diferentes de

La elección del potrero de destete

Uno de los aspectos claves en el éxito de esta práctica de manejo es la elección con antelación (**planificación**) y preparación del potrero adonde serán destinados los corderos una vez destetados, resaltando que esta planificación no tiene costo

adicional. Esta instancia la podemos definir como el verdadero **comienzo** del destete.

Cuando definimos el **potrero** en cuestión deberíamos tener en cuenta:

- **Pasturas** a ofrecer de buena digestibilidad y cantidad en la época a ser utilizados, sin pastos gruesos y/o viejos procedentes de otra estación, con adecuada uniformidad en la oferta y topografía a efectos de evitar concentraciones indeseables de corderos.

La calidad de la pastura es crítica para el crecimiento de los corderos, de aquí la espectacular respuesta en esta etapa al uso de mejoramientos con leguminosas.

- **Tamaño** adecuado a la cantidad de corderos a destetar, a razón de 6-7 corderos por hectárea (previo descanso del potrero), dependiendo del tiempo de ocupación programado.

- Buen estado de **alambrados** perimetrales: a efectos de asegurar su contención

- Disponibilidad de **agua** de buena calidad y de fácil acceso.

Frecuentemente los tajamares ocasionan problemas de acceso en veranos secos, existiendo riesgos de vida de los corderos.

- **Sombra** adecuada, pensando en el verano.

Una vez definido el mismo, es importante su preparación atendiendo aspectos nutricionales y fundamentalmente sanitarios (parasitarios), para lo cual es determinante **retirar el pastoreo ovino del potrero elegido durante los tres meses previos y utilizarlo con categorías vacunas adultas**, preferentemente novillos de más de dos años y/o vacas de invernada. (SUL-DILAVE, Nari-Castells 1993).

Este manejo logra producir pasturas seguras desde el punto de vista parasitario y una adecuada disponibilidad y calidad para el destete de los corderos.

Manejo del destete

Llegada la fecha del destete, se encerrarán en un mismo corral por 24 horas madres e hijos, con buena sombra pero sin acceso a comida ni bebida.

Luego de este encierre conjunto, madre e hijo serán separados y mantenidos encerrados por otras 24 horas, permitiendo el acceso al agua de los corderos.

Luego de este período serán llevados al potrero seleccionado.

Los corderos recibirán las siguientes prácticas sanitarias:

- **Dosificación antihelmíntica.** Es tal vez la desparasitación del destete, una de las tomas estratégicas más importante, por lo cual habría que extremar los cuidados para que la misma tenga alta efectividad

(droga y dosis adecuadas y correcta aplicación). Su posterior chequeo coproparasitario (10-12 días post-toma) a efectos de corroborar su efectividad, nos dará confianza y tranquilidad. Los corderos serán largados en el potrero preparado a tal fin, luego de 10 horas de administrado el antihelmíntico (“descarga post-toma de huevos vivos”). Con estas precauciones estaríamos logrando animales libres de lombrices pastoreando pasturas seguras, en el momento parasitario más sensible de la vida del ovino.

- **Vacunación contra Clostridiosis.** Mancha, Gangrenas y sobre todo Enterotoxemia (“Riñon Pulposo”), son tipos de Clostridiosis dables de esperar en esta categoría y en esta época del año, por lo cual se sugiere su protección a través de la vacunación. En general el plan propuesto consiste en: vacunación preparto de las madres, la vacunación del cordero luego de la señalada y su revacunación al destete lo que completan -ambas-, la primovacuna. El intervalo entre las dos dosis es variable y dependiente del tipo de vacuna utilizada.

- **Inspección podal y recorte de pezuñas.** Si en el establecimiento hay antecedentes de Pietín, se sugiere en este momento la lectura de pezuñas y recorte preventivo de pezuñas a efectos de iniciar la recría con una generación de animales sanos. Los enfermos curables serán tratados y los incurables aislados definitivamente.

Otras recomendaciones

- En establecimientos que no se esquilan corderos, es fundamental un desoje (recorte de la lana alrededor de los ojos)

- Es conveniente que los corderos pastoreen en compañía de algunas ovejas falladas (o que no criaron corderos) a efectos de facilitar su arreo, acceso al agua, etc.

- De existir la posibilidad de tener más de un lote de animales destetados, es fundamental su aparte por peso, destinando a los más livianos las mejores oportunidades nutricionales y sanitarias.

- El encierre del destete es una excelente oportunidad para que los corderos aprendan a comer suplementos, sobre todo si sus madres ya lo saben hacer.

Administrando pequeñas y progresivas cantidades de grano, -generalmente sorgo-, permiten un fácil aprendizaje que se mantendrá por años en la memoria del cordero.

- Finalmente, dada la inexperiencia de esta categoría animal, la recorrida frecuente y el entrenamiento en los primeros días en el acceso al agua, evitará accidentes e inconvenientes.

El seguimiento parasitario a través de análisis coprológicos rutinarios (mensuales), es fundamental.