



Calendario de Manejo Anual de la Oveja de Cría

Ing. Agr. Marcelo Grattarola

El esquema siguiente tiene como objetivo ser una guía para la planificación del manejo de la oveja de cría a lo largo del año. Es un resumen muy ajustado de las actividades que se consideran más relevantes separadas por temática principal.

En la medida que planifiquemos con anticipación los distintos eventos que necesariamente se suceden a lo largo del año, estaremos en mejores condiciones de realizarlos en tiempo y forma lo que hará la diferencia en los resultados reproductivos.

En este calendario, la época de servicio para cada región ó tipo de suelo, es la que se considera más adecuada de acuerdo a una mayor fertilidad y fecundidad (mellizos) al momento de la encarnera.

Por otro lado, con este planteo se contempla una mejor coincidencia de la cantidad y calidad del pasto ofrecido, con los requerimientos de una oveja gestante durante el año, lo que posibilita obtener corderos de mayor peso al nacer y por lo tanto mayor sobrevivencia. Además, esta época de servicio en general presenta mejores condiciones climáticas a la parición en los meses de setiembre y octubre.

En cuanto al período de servicio, se considera que en el otoño 35 a 40 días es suficiente para preñar la mayoría de las ovejas si la condición corporal y la sanidad no son limitantes.

Como medida adicional durante el año, se sugiere el manejo de la condición corporal (CC) previo al servicio y en la etapa parto para ajustar la asignación de la pastura necesaria para lograr los objetivos, mediante el loteo de los vientres.

Se incluye la esquila pre-parto como una tecnología que permite una mayor sobrevivencia de corderos en la medida que se realice por lo menos 30 días antes de la parición de la primer oveja.

Con respecto a la protección pos-esquila, hoy existen herramientas como peines que dejan mayor altura de lana (R13, Beiyuan y Cover) y capas de polietileno de probada eficacia que mejoran notoriamente la protección y bajan mucho el riesgo de mortandad.

En el caso de las parasitosis gastrointestinales se establecen las dosificaciones estratégicas : pre-servicio, parto, señalada y destete; y luego se sugiere el monitoreo por análisis coproparasitario (hpg) para las tomas tácticas intermedias.

En cuanto a las enfermedades podales, se establece el verano como la época más adecuada para la revisión de patas de todos los animales y el loteo correspondiente según la lesión presente. El baño podal en conjunto con la revisión, permitirá comenzar el año con animales sanos, lo que facilitará el manejo posterior.



PLANIFICACIÓN DEL MANEJO DE LA OVEJA DE CRÍA CON ESQUILA PREPARTO

Fecha de servicio : ZONA NORTE (Basalto) : **1° abril al 5 de mayo**

ZONA SUR y ESTE (Cristalino, Arenosos y Sierras) : este calendario se corre 20 días, del 20 abril al 25 de mayo

MES	ACCIÓN	Selección	Manejo	Sanidad	Lanas
enero	DESTETE REVISAR PATAS		Destete. Refugo ovejas viejas. Revisación de patas y ubre	Corderos : dosificación, clostridiosis y baño podal	
febrero	CLASIFICACIÓN DESOJE y LIMP COLA	Clasificar carneros Planificar reposición	Clasificación de ovejas por CC Borregas : peso, tipo y tetas		Desoje y limpieza de cola
marzo	DOSIFICACIÓN CLOSTRIDIOSIS		Mejora de la alimentación en vientres de baja CC	Ovejas : dosificación y clostridiosis	
abril	LOTEAR VIENTRES SERVICIO		Lotear ovejas y borregas Asignar carneros		
mayo	FIN SERVICIO RESERVA POTREROS	Refugo de corderas para engorde	Retirar carneros Reserva potrereros preparto		
junio	ECOGRAFÍA		Ecografía Cortar cola corderas	Dosificación según HPG	
julio	ESQUILA		loteo ovejas por CC Asignar potrereros parición		Esquila preparto Protección pos-esquila
agosto	NUTRICIÓN PREPARTO		Asignar alimentación según CC	Dosificación estratégica preparto	
setiembre	PARICIÓN		Recorrer y registrar :		
octubre	SEÑALADA RESERVA DESTETE	Peso de vellón corderas	Reservar potrereros destete	Dosificación ovejas Ectima corderos	
noviembre	DOSIFICACION y CLOSTRIDIOSIS CORD		Loteo de corderas para mejor recría	Dosificación y clostridiosis corderos	
diciembre	DOSIFICACIÓN OVEJAS		Destete de corderos de punta	Dosificación ovejas según HPG	

* El baño para piojo en cuanto a la época, producto y el método a utilizar, se realizará según recomendación técnica

* Coordinar la realización de diámetro por OFDA en las borregas, a partir del mes de marzo

* Se sugiere realizar análisis coprológico (hpq) entre las tomas estratégicas para monitorear parasitosis gastrointestinales

* La limpieza de cola previo a la encarnada será amplio y contra el cuero para que sea efectivo hasta la esquila preparto