



Tratamiento y Control de Afecciones Podales

Dr. Sergio Fierro

Se viene el verano y como ya es conocido, es el momento adecuado para comenzar el control de las afecciones podales, tomando medidas para disminuir el trabajo del resto del año en momentos menos convenientes. Los puntos clave para realizar el trabajo con éxito son: 1- correcto diagnóstico y clasificación de las diferentes afecciones, lo cual es fundamental para ahorrar en tratamientos no apropiados y horas de trabajo; 2- tratamiento adecuado para cada patología; 3- correctas instalaciones; 4- eliminación de animales no recuperables.

A continuación detallamos algunas de las afecciones más comunes responsables de las “manqueras y rengueras” encontradas a nivel de establecimiento, que muchas veces terminan complicadas con miasis. El lector cuenta además con las Hojas Coleccionables N° 5, 6 y 40; el Libro Sanidad Ovina – SUL; Serie FPTA N° 18 para profundizar en el tema.



PIETIN “FOOT ROT”

- ◆ Infecciosa, altamente contagiosa.
- ◆ Causada por bacteria que vive en ausencia de aire.
- ◆ Principalmente en otoño, primavera y veranos lluviosos.
- ◆ Carneros son los principales introductores y difusores.
- ◆ La enfermedad comienza por espacio interdigital (llaga), luego ataca partes duras desprendiendo talones y avanza hacia zona externa de la pezuña.
- ◆ Tratamiento y control: Eliminación de portadores crónicos e incurables (Grados 3 avanzados, 4 y 5). Animales sanos pediluvio higiénico (Sulfato de Zinc al 10 % por 15 min ó Formol 40 al 5% por 5 min) y destinarlos a potreros libres de ovinos por 15 días. Lesiones curables (Grado 1 a 3 inicial): tres pediluvios en 15 días y nueva evaluación.



Foto gentileza del Dr. Pedro Scremini

ABSCESO DE DEDO

- ◆ Infecciosa, no se contagia entre los animales.
- ◆ Asociada a presencia de barro, campos húmedos.
- ◆ Afecta uno de los dedos: inflamación, calor, dolor, colecta de pus que se exterioriza por zonas blandas (zona de pinzas y corona).
- ◆ Tratamiento: despezueñado profundo y pediluvio



ABSCESO PODAL

- ◆ Infecciosa, no se contagia entre los animales.
- ◆ Afecta región por encima de la pezuña (corona).
- ◆ Inflamación, calor, muy dolorosa, colecta de pus localizada (difícil de drenar).
- ◆ Tratamiento: antibióticos inyectables pero con poco éxito.



DERMATITIS MICÓTICA

- ◆ Asociada a épocas lluviosas y pasturas abundantes.
- ◆ Lesión sangrante de apariencia tipo una frutilla.
- ◆ Zona afectada: cuartilla, corona y “pichicos”.
- ◆ Tratamiento y control: potreros “más pelados”, pediluvio con sulfato de Zinc al 10 % o formol 40 al 5% , antibióticos inyectables.



SEPARACIÓN DE MURALLA

- ◆ Separación entre la pared externa de la pezuña y la suela.
- ◆ No es infecciosa, ni se contagia entre los animales.
- ◆ Tratamiento: extracción del barro si existe y recorte de la pezuña sobrante.



MANQUERA POST- BAÑO

- ◆ Aparece pocos días luego de realizar baño de inmersión.
- ◆ Provocada por contaminación del baño (uso del mismo pie de baño por varios días).
- ◆ Claudicación y pérdida de estado de la majada.
- ◆ Tratamiento: cura sola.
- ◆ Prevención: se recomienda el uso de desinfectantes en el baño de inmersión (Sulfato de Zinc: 500 grs./1000 litros de agua) al armar el pie de baño.



Foto gentileza del Dr. Daniel Castells

ECTIMA CONTAGIOSO

- ◆ Enfermedad Viral.
- ◆ Afecta principalmente zonas de unión muco-cutánea (labios, morro), pezones, patas (corona, nudo, cuartilla).
- ◆ Tratamiento: no existe específico, se basa en el control de las infecciones secundarias y evitar bicheras.
- ◆ Prevención: vacunación por escarificación.



TRAUMATISMOS

- ◆ Claudicaciones por motivos varios: espinas, rosetas, flechilla, etc.
- ◆ Muchas veces son causa determinante de abscesos.