

## Manejo

# Recomendaciones técnicas para los meses de enero y febrero



Ing. Agr. José Rivero  
jrivero@sul.org.uy

Área de Transferencia de Tecnología



Ing. Agr. Matías Orihuela  
morihuela@sul.org.uy

Área de Transferencia de Tecnología

### ENERO – PRIMERA QUINCENA

#### *Corderos: destetar*

✓ Encerrar para destete: 1 día con las madres y sin agua y 1 día los corderos solos con sombra y agua. Al largar, usar “ovejas señuelos” y enviar a potrero definitivo con sombra, agua y pastura de calidad previamente reservados.

✓ En caso de sistemas intensivos (buena alimentación) encerrar: 1 día con las madres y sin agua, 1 día los corderos solos con sombra y agua y las ovejas con sombra y sin agua. Soltar todo a las 48 horas.

✓ Marcar un lote al azar (10%) para pesar, establecer promedio y variación en kilos. Realizar manejo diferencial en aquellos corderos con menos de 18- 20 kilos según raza, con suplementación proteica.

✓ Dosificar contra parásitos gastrointestinales con una droga de eficacia conocida 12 horas previas a la asignación al potrero de destete reservado 90 días antes (sin pastoreo ovino). Comprobar eficacia por medio de análisis coprológico (HPG) a los 10 días. Re vacunación contra clostridiosis (segunda dosis de la primovacunación).

### ENERO – SEGUNDA QUINCENA

#### *Hembras: Revisación de patas y loteo*

✓ Revisar patas a todos los vientres. Si hubiera pietín, establecer tres lotes: sanas, recuperables y crónicas. Pasar por baño podal primero las ovejas sanas.

✓ Utilizar sulfato de zinc al 10% o formol al 5% en el pediluvio. Es importante recordar que no se deben utilizar en simultáneo. Consulte con su veterinario de confianza.

✓ Realizar tratamiento de tres baños podales en 10 días a las recuperables. Volver a revisar e integrar a los sanos, los animales recuperados.

✓ Eliminar las ovejas crónicas o aislarlas para evitar contagio. En el mismo trabajo identificar las ovejas viejas y refugarlas. Refugar también los vientres con problemas de ubre.

✓ Establecer el lote apto para encarnerar.

✓ Los vientres en peor estado corporal (menor a 3) asignarlos a pasturas que permitan mejorar su condición corporal para la próxima encarnerada. El campo natural reservado es una opción barata de recuperar el estado de nuestras majadas previo a la encarnerada.

### FEBRERO – PRIMERA QUINCENA

#### *Carneros: Revisar y clasificar*

✓ Realizar la revisión de carneros y establecer 3 lotes: aptos para servicio, suplentes y refugo. Si se utiliza un 3% de carneros sobre la majada servida, determinar la estrategia de compra si hicieran falta reproductores.

✓ Planificar la disponibilidad de “retarjos” o capones “androgenizados” si se realiza inseminación artificial (4% del total de vientres a inseminar).



✓ Atender la alimentación de calidad de los carneros con sombra y agua.

✓ Dosificar contra parásitos y comprobación de eficacia a los 10 días por hpg.

✓ Limpiar prepucio, “desoje” y limpieza de cola. Emprolijar pezuñas.

*Corderos: Monitoreo*

✓ Pesar y muestrear (HPG) del lote de corderos destetados.

#### **FEBRERO - PRIMERA QUINCENA**

*Borregas: Pesar y clasificar*

✓ Pesar las borregas que van a servicio y armar 3 lotes por rango de peso: punta (>35 kg) medio (30 – 34 kg) y cola = refugio de servicio (<30 kg). Eliminar los refugos por peso o por defectos eliminatorios, si no se hubiera realizado antes.

✓ Apartar el lote medio y mejorar la alimentación para que alcancen la encarnerada con 38-40 kg como mínimo, con alimentación mejorada o suplementación, si no alcanzara con campo natural (50-70 gr/día).

✓ Realizar un baño de patas preventivo.

✓ Monitorear la parasitosis gastrointestinal por medio de HPG.

✓ Dosificar si fuera necesario y comprobar la eficacia a los 10 días por HPG.

*Corderas: Pesar y clasificar*

✓ Seleccionar corderas para encarnerar con 38-40 kg.

✓ Realizar la encarnerada un mes después de iniciada la encarnerada de la majada.

#### **FEBRERO - SEGUNDA QUINCENA**

*Ovejas: Clasificar*

✓ Revisar las ovejas adultas por boca, ubre y condición corporal (en caso de que no se haya hecho antes).

✓ Establecer el lote apto para encarnerar.

✓ Los vientres con peor condición corporal ( $CC \leq 3$ ), asignarles pasturas que permitan mejorar su estado para la próxima encarnerada. El campo natural reservado es una opción barata de recuperar el estado de nuestras majadas previo a la encarnerada.

✓ Realizar un baño de patas preventivo.

✓ Monitorear la parasitosis gastrointestinal por medio HPG.

✓ Dosificar si fuera necesario y comprobar la eficacia a los 10 días por HPG.