

Manejo

Recomendaciones para los próximos meses



Ing. Agr. Rafael Saavedra Methol
rsaavedra@sul.org.uy
Área de Transferencia de Tecnología



Ing. Agr. José Rivero
jrivero@sul.org.uy
Área de Transferencia de Tecnología

Sugerencias para los meses de diciembre, enero y febrero, servicio del 15 al 20 de marzo. Adelantar las fechas de 15 a 20 días para servicios de febrero y retrasar la fecha 15 a 20 días para servicios de abril.

Diciembre:

- ✓ Evaluar posibilidad de destetar los corderos por lotes de parición en majadas que justifique, por tamaño o manejo. Establecer pesos mínimos de corderos por lotes para manejo diferencial.
- ✓ Observar calidad y disponibilidad de pastura al destete por posible suplementación de corderas/os.
- ✓ Repasar/recorrer categorías al menos 2 veces por semana, por incidencia de miasis (bicheras).
- ✓ Monitorear parasitosis gastrointestinales por HPG en ovejas y recrías.
- ✓ Planificar revisión en caso de majadas afectadas por problemas podales.
- ✓ Reservar potrero para destete durante los meses venideros. Libre de ovinos.

Enero – Primera Quincena

Corderos: destetar

- ✓ Encerrar para destete: 1 día con las madres y sin agua y 1 día los corderos solos con sombra y agua. Al largar los corderos, usar “ovejas como señuelos” en piquetes con alambrados “seguros”. Una vez que los corderos estén tranquilos, largarlos al potrero definitivo con sombra, agua y pastura de calidad previamente reservados.
- ✓ En caso de sistemas intensivos (buena alimentación), encerrar; 1 día con las madres y sin agua, 1 día los corderos solos con sombra y agua, y las ovejas con sombra y sin agua. Soltar todo a las 48 horas.
- ✓ Marcar un lote al azar (10%) para pesar, establecer promedio y variación en kilos. Realizar manejo diferencial en aquellos corderos con menos de 18-20 kilos según raza con suplementación proteica.
- ✓ Dosificar contra parásitos gastrointestinales con una droga de eficacia conocida 12 horas previas a la asignación al potrero de destete reservado 90 días antes (sin pastoreo ovino). Comprobar

eficacia por medio de análisis coprológico (HPG) a los 10 días. Re vacunación contra clostridiosis, segunda dosis de la primovacunación.

Enero – Segunda Quincena

Vientres: Revisación de patas y loteo

- ✓ Revisar patas a todos los vientres. Si hubiera pietín, establecer tres lotes: sanas, recuperables y crónicas. Pasar por baño podal primero las ovejas sanas.
- ✓ Realizar tratamiento de tres baños podales en 10 días a las recuperables.
- ✓ Eliminar las ovejas crónicas o aislarlas para evitar contagio. En el mismo trabajo identificar las ovejas viejas con un cero 0 y refugarlas. Refugar también los vientres con problemas de ubre.
- ✓ Establecer el lote apto para encarnerar.
- ✓ Los vientres en peor estado corporal (menor a 3) asignarlos a pasturas que permitan mejorar su condición corporal para la próxima encarnerada. El campo natural reservado es una opción barata de recuperar el estado de nuestras majadas previo a la encarnerada.

Febrero: Primera quincena

Carneros: Revisar y clasificar

- ✓ Revisar los carneros y establecer el número de animales tentativo para cubrir las necesidades, con un 3% de carneros. Planificar posible compra de acuerdo a vientres a servicio teniendo en cuenta carneros suplentes.
- ✓ Planificar la disponibilidad de “retarjos” o capones “androgenizados” si se realiza inseminación artificial (4% del total de vientres a inseminar)
- ✓ Atender la alimentación de calidad de los carneros con sombra y agua.
- ✓ Dosificar contra parásitos y comprobación de eficacia a los 10 días por hpg.



- ✓ Limpiar prepucio, “desoje” y limpieza de cola. Prolijear pesuñas.

Corderos: Monitoreo

- ✓ Pesar y mostrar (HPG) del lote de corderos destetados.

Febrero: Primera quincena

Borregas: Pesar y clasificar

- ✓ Pesar las borregas que van a servicio y armar 2 lotes por rango de peso: punta (>34 kg) medio (30 – 34 kg). Eliminar los refugos por peso o por defectos eliminatorios, si no se hubiera realizado antes.
- ✓ Apartar el lote medio y mejorar la alimentación para que alcance la encarnizada con 36/40 kg como mínimo, si no alcanzara con campo natural suplemental con 50-70 gr. /día.
- ✓ Realizar un baño de patas preventivo.
- ✓ Monitorear la parasitosis gastrointestinal por medio de HPG.
- ✓ Dosificar si fuera necesario y comprobar la eficacia a los 10 días por HPG.

Corderas: Pesar y clasificar

- ✓ Seleccionar corderas para encarnerar con peso $\geq 38-40$ kg.
- ✓ Realizar la encarnerada un mes después de iniciada la encarnerada de la majada.

Febrero: Segunda quincena

Ovejas: Clasificar

- ✓ Revisar las ovejas adultas por boca, ubre y Condición Corporal (en caso de que no se haya hecho antes).
- ✓ Establecer el lote apto para encarnerar.
- ✓ Los vientres en peor estado corporal $CC \leq 3$, asignarles una pasturas que permitan mejorar su condición corporal. El campo natural reservado es una opción barata de recuperar el estado de nuestras majadas previo a la encarnerada.
- ✓ Realizar un baño de patas preventivo.
- ✓ Monitorear la parasitosis gastrointestinal por medio HPG.
- ✓ Dosificar si fuera necesario y comprobar la eficacia a los 10 días, por HPG.

