



Algunos comentarios sobre los vientres que van a parir

Ing. Agr. Néstor Cabrera

La posibilidad de que una especie se mantenga como tal en el tiempo, depende en gran medida de que la multiplicación de sus individuos se realice de la mejor forma posible. Los ovinos no son la excepción, y además su multiplicación representa un negocio para el productor. Es por esto que vamos a realizar algunos comentarios acerca de que podemos hacer para que nuestras ovejas y borregas preñadas lleguen a una parición acorde a nuestras expectativas.



Evaluación de condición corporal.

El o los corderos que se están gestando

El o los fetos que se están desarrollando en el vientre materno experimentan un crecimiento incremental en los últimos 45 días de la preñez, respecto a las primeras etapas de la gestación, lo que determina altos requerimientos nutricionales de alimentación por parte de la madre. Más del 70% del peso del cordero al nacer se produce en esta etapa. Gran parte de las posibilidades de que ese cordero nazca y sobreviva en el nuevo ambiente va a depender de su peso al nacer. Corderos muy livianos (2 kilos) tienen menos posibilidades, al no tener reservas corporales y generalmente mueren por hipotermia (baja temperatura corporal). Por lo tanto es en esta etapa donde no solo la cantidad de comida que reciba la oveja es importante sino también la calidad de la misma. Alimentos de baja calidad pueden no alcanzar a cubrir los requerimientos de los vientres preñados. Debe considerarse que la capacidad digestiva de las ovejas gestantes está

disminuida y por lo tanto la calidad de la comida es de primordial importancia. Además de cubrir las necesidades del feto la alimentación adecuada disminuye la ocurrencia de desbalances en el metabolismo que pueden provocar la muerte de la oveja (toxemia).

Algunas cosas que podemos hacer:

- Tener identificadas las ovejas de acuerdo a que gestación están realizando, (mellizos o únicos) para administrarles forraje adecuado en función de cada situación.
- La identificación a la que nos referimos la tenemos si realizamos ecografía previamente.
- Separar ovejas según estado corporal (condición corporal hoja coleccionable N° 15) y administrar forraje de acuerdo al mismo
- Reservar potreros con alimentación adecuada para este período de últimos 45 días.
- Si es necesario, suplementar las ovejas con pastoreos por horas en pasturas de mejor calidad, o suministrar alimentación extra como granos, silo u otros.
- Para ser efectivos al dar suplementos y no perder tiempo en acostumbrar la majada a la nueva forma de comer, es conveniente que hayamos enseñado a las ovejas a comer previamente (en períodos en los cuales tenemos menos urgencias, o aprovechando a que aprenda y memorice más de una categoría, por ej. ovejas con cordero al pie)
- Pequeñas cantidades de suplemento son un aporte de gran valor para mejorar la alimentación que brinda el campo natural.

Las ovejas y borregas

Hemos hablado de cómo promover una buena alimentación para el o los fetos; hablemos algo de los vientres;

¿Qué podemos hacer?

- separar ovejas de borregas; tienen diferentes necesidades de alimentación y atención al parto
- ubicar a los vientres en los potreros reservados, algunos días antes de comenzar a parir para que tengan conocimiento del terreno
- si realizamos esquila pre parto (recomendamos que si) apliquemos medidas para el abrigo de la majada que no interfieran en su comportamiento natural como encierros asiduos o prolongados, arreos u otras que no permitan que las ovejas y o borregas se alimenten bien.
- Si no hicimos esquila pre parto, realicemos una buena limpieza en la zona de la ubre con descole (retiro de puntas quemadas) y limpieza de ojos unos 30 días antes de empezar a parir; no hablaremos de aspectos sanitarios dado que serán tratados en otra entrega de esta publicación

El o los potreros de parición

¿Como deben ser?

- Potreros secos, con buena comida y abrigo
- fáciles de ser recorridos
- libre de predadores
- orientados al norte por tener más horas sol

La dotación de animales

La dotación estará en función del alimento disponible, del sistema de pastoreo que utilicemos y de cuán acostumbrada esté la majada a manejos más o menos intensos. Por ejemplo si contamos solo con campo natural y una majada que no esta acostumbrada a la presencia del hombre manejemos una dotación acorde con la cantidad de forraje y con la dotación que habitualmente utilizamos. Cuando existen otras situaciones como: pastoreos por horas en pasturas mejoradas, vamos a tener seguramente una dotación mayor a la normal en el campo natural, y aún mayor en la pastura mejorada. Debemos acostumbrar la majada a estos manejos no habituales, para no interferir con su comportamiento natural como madre.

Algunos comentarios finales:

- al momento del parto la intervención del hombre no debe existir o debe ser mínima, asociada solo a casos en que no se de un parto normal;
- la nutrición, el manejo y la sanidad son elementos claves para un buen resultado.
- El resultado final de este proceso debe ser uno o más corderos vivos y viables con su madre dando buena leche; esto es posible con mucha planificación, trabajo, y control en todos los pasos.



Secretariado Uruguayo de la Lana • Area de Economía y Difusión